

## HIPOKALSEMİ (Süt Humması)

Yeni doğum yapmış süt ineklerinde kandaki kalsiyum ve fosfor miktarının düşmesi sonucu ortaya çıkan ve hayvanın yatıp kalkamaması ile karakterizedir. Çoğunlukla süt verimi yüksek, fazla doğum yapmış ve yaşlı ineklerde genellikle doğumdan sonra 6-72 saat içinde görülür. Hastalık her yaş ve ırkta görülür ise de çoğunlukla süt verimi yüksek kültür ırkı ineklerde (jersey,holstein ve isviçre esmeri) daha çok rastlanır.

### Belirtiler:

Hastalıkta görülen belirtiler doğum öncesi ve sonrası günlerde ortaya çıkar. Hastalığın indisansı süt veriminin artışına paralellik arz eder. Belirtiler oldukça ani başlar. Duyarlılık artışı, heyecanlanma, tetani, baş ve ayaklarda titremeler, baş sallama, diş gıcırdatma gibi belirtiler görülür. Devam eden süreçte hayvan arka ayaklarının üzerine çöker ve göğüs üstüne kendini yere bırakır. İştah yoktur. Başını böğrüne dayayarak yatar ve bilinç yarı yarıya kaybolmuştur. Bacaklardaki tetani kaybolmuş, hayvan ayağa kalkamaz.

Hastalığın son döneminde hayvan çevreden gelen uyarılara hiçbir reaksiyon göstermez. Hayvan yan tarafına yatmış ve tam koma durumuna girmiştir. Vücut sıcaklığı düşmüştür(36-37).Hastalar 12-24 saat içinde sağaltılmadıkları takdirde solunum veya kalp durması sonucu ölürlür.

### Korunma:

Bu hastalıktan korunmada en önemli yöntem hayvanların kuru dönemde dengeli bir rasyonla beslenmesidir. İnekler doğuma 6 hafta kala kuruya alınmalıdır. Kuru dönemde yiye bildiği kadar kuru ot verilmelidir. Enerjisi yüksek yemlerden ve yağlı tohum küspelerinden kaçınılmalıdır.

### Tedavi:

Veteriner Hekime danışılmalıdır.

