

RUMEN ASİDOZU

Hastalığın Kökeni:

Sığırlar tarafından karbonhidratça zengin yemlerin (un,ekmek,kepek,şeker pancarı,patates,üzüm vs)aniden ve bol miktarda yenmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır.Uzun süre aç kalan hayvanların enerjice zengin rasyonların verilmesi sığırlarda akut asidoz oluşumunu sağlar. Halk arasında "Tohlamala" veya "Hamurlama" gibi isimlerle bilinir.

Belirtiler:

Asidozis'in hayvanlarda hafif, orta ve şiddetli formları görülebilir.

Hafif form; birkaç gün geçici iştahsızlık, süt miktarında ve süt yağ oranında düşüşler, gaitanın gri renkte ve hafif ishal gözlenir.

Orta form; hayvanlarda belirtiler yem alımından 12 - 24 saat sonra ortaya çıkar. Hayvanlar aniden yemden kesilir ve su içmezler. Süt verimi azalır veya tamamen durur. Çoğu hayvanlar yatarlar, kalkamazlar. Hastalığın ikinci gününde ishal başlar, birkaç saat içinde ishal kesilir. Hastalar tedavi edilmezse 24 - 72 saat içinde ölür.

Şiddetli form; hayvanlarda belirtiler yem alımından 6 - 12 saat sonra oluşur. Süt verimi tamamen durur. Hayvanlarda şiddetli ishal, zehirlenme belirtileriyle 12 saat sonra yatalak olur. Hastalar tedavi edilmezse 12 - 24 saat sonra ölür.

Korunma:

Yeni bir rasyona geçerken karbonhidratça zengin ve az kaba lifli rasyona geçişten kaçınılmalıdır. Böyle bir rasyona 10-14 gün içinde geçilmelidir.

Tedavi:

Veteriner Hekime danışılmalıdır.

