

MASTITİS

Hayvanların memelerinde görülen çok çeşitli meme hastalıkları vardır. Bunlardan birisi olan ve bölgemizde çok görülen; memelerin birinde veya birden fazlasında gözlemlenen ateş, kızarıklık, şişkinlik, memelerde sertlik, süt veriminde ani düşmeler ve sütün yapısının bozulması (sütün renginin sarı olması, pıhtılı olması ve pıhtı tıkaçları) ile karakterize mastitis dediğimiz meme iltihaplarıdır. Meme iltihabı; meme bezlerinin herhangi bir sebeple (Bakteriler, mantarlar, virüsler gibi etkenlerle) iltihaplanmasıdır. Meme iltihapları sadece süt verimini azaltmakla kalmayıp, memenin bir veya birkaç lobunun körleşmesine, hatta tüm meme loplarının işlevlerini kaybetmesine sebep olabildiği gibi, hayvanın kasaplık olmasına bazen de ölümüne kadar sebebiyet vermektedir. Meme iltihapları önemli miktarda süt kayıplarına, tedavi ve zaman kaybına sebebiyet verdiği için hayvan sahiplerine yüklü maliyet getirmektedir.

Belirtileri:

Mastitisli bir ineğin memesinde şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi belirtiler görülür. Süt sulu bir sıvı şeklindedir ve içerisinde pıhtılar yer alır. Bazen bu pıhtılar birleşerek ipliksi bir görünüm alırlar ve ayrıca kan da görülebilir. Perakut veya sistemik mastitislerde ise memedeki bu enfeksiyon nedeniyle vücudun tamamı etkilenir. Bakteriler tarafından üretilen toksinler, ateşe ve iştah kaybına yol açar. Çok şiddetli olgularda memedeki bakterilerin ürettiği toksinler, depresyon, deride dökülmeler, hızlı solunum, kaslarda zayıflama ve kollaps gibi belirtilerle seyreden şiddetli toksik şoka neden olur. Süt üretiminde tamamen durabilir. Etkilenen meme lobu gangrenli, soğuk ve mavimsi görünebilir. Dokular bu şekilde geldikten sonra süt üretimi işlevinin yeniden gerçekleşmesi neredeyse olanaksızdır.

Korunma:

Mastitis, etkileşimli birkaç olayın veya durumun sonucunda gerçekleşir. Bir risk etmeninin tek başına hastalığa yol açması ender durumlarda görülür. Bu nedenle önlemler birden fazla risk etmeni hedeflenerek alınırsa daha etkili olur.

Başlıca alınacak önlemler;

- Sağım hijyenine dikkat edilmeli,
- Sağım makinelerinin temizliği ve doğru sağım yapılmalı,
- Sağım sonrası hijyene dikkat edilmeli,
- Kuru döneme giriş,
- İneğin ortamı iyileştirilmeli,
- Hasta hayvanlar sağlıklı hayvanlardan ayrılmalı.

Tedavi:

Veteriner Hekime danışılmalıdır.

