

## BUZAĞI BESLEME:

Yeni doğan buzağuların hastalıklara karşı bağışıklıkları yoktur. Hastalıklara karşı bağışıklık kazanılması ancak doğumdan sonra ilk 4 saatte ağız sütü alınarak sağlanır. Buzağının doğduğunda her öğünde içeceği ağız sütü miktarı doğum ağırlıklarının %5'i kadardır.

Buzağuların bu ilk ağız sütünü almalarından 12 saat sonra aynı miktarda ağız sütü almaları sağlanmalıdır. Buzağulara mutlaka ilk 3 gün ağız sütü verilmelidir. Buzağular günde, canlı ağırlıklarının % 8-10 u kadar süt tüketmelidirler. Ortalama olarak buzağular 5-8 hafta arasında süttten kesilebilir.

Buzağular doğumdan itibaren süttten kesilinceye kadar, günde 500g kuru madde tüketmelidirler. Buzağuların sindirim sistemlerinin gelişebilmesi için özellikle buzağı başlangıç yemlerinin doğumdan sonra 3. günden itibaren buzağuların önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca buzağuların önünde kaliteli kuru ot, kuru yonca ve temiz su da olmalıdır.

Buzağı başlangıç yemlerinin içinde %5oranında melas bulunması hem iştahı artırır hem de yemde tozlaşmayı önler. Buzağı başlangıç yemleri buzağulara 12 haftalık oluncaya kadar yedirilir ve yem tüketimi günde 1,5-2kg olacak şekilde sınırlanmalıdır.

Buzağı süttten kesildikten sonra buzağı başlangıç yemleri azaltılarak buzağı büyütme yemlerine geçilir. Buzağı büyütme yemlerine 3.aydan sonra başlanmalıdır.

