

## ABOMASUM DEPLASMANI (Abomasum Yer Değişiklikleri)

Normalde karın boşluğunun tabanında bulunan abomasumun gaz ve sıvıyla dolarak, genişlemiş şekilde sağa-yukarı ya da sola-yukarı şekilde yer değiştirmesidir. Özellikle yüksek verimli süt ineklerinde ve tipik semptomlarla karakterize bir hastalıktır. Hastalığın sebebi tam olarak açıklanamamış değildir. Kompleks faktörlerin birlikte veya değişik ölçülerde etkisi söz konusudur.

Bunlar:

Beslenme Faktörleri:

Hastalık en çok kış aylarında ve ahır besisi döneminde ortaya çıkar. Sığırların daha çok konsantre yem ve daha az kaba yem ile beslenmeleri, öğün sayısının 2 veya 3'e inmesi, konsantre yemin yağ ve protein oranının fazla olması; kuru dönemden laktasyon dönemine geçişin ani yem değişiklikleri hastalığın beslenmeye bağlı başlıca hazırlayıcı sebepleridir. Yapılan çalışmada konsantre yemin kaba yeme oranı 1/3 olduğu zaman hastalık gözlenmemiştir.

Fizyolojik ve Patolojik Stres Faktörleri:

Ahır stresi (uzun süre hareketsiz kalmak),yüksek süt verimi, yaşlılık ve doğum dönemi hastalık riskini artırmaktadır. Metabolik hastalıklar, yüksek süt verimi, metritis, mastitis, yavru atmalar, kronik tırnak hastalıkları abomasum deplasmanlarıyla ilişkili hastalıklardır.

**Belirtileri:**

Hastalık iştahsızlıkla başlar Özellikle silaj ve konsantre yemleri yemek istemezler. Süt verimi düşer, hayvan zayıflar. Hastalığa genellikle doğum yapmış ya da doğumuna az kalmış ineklerde rastlanır. Sol tarafa deplasmanda hayvana arkadan bakıldığında, sol tarafta genişleme görülür. Sağ tarafa deplasmanda genel durum 2-10 gün içinde bozulur yem yeme tamamen ortadan kalkar,geviş getirme durur.Hayvanın arkadan bakıldığında sağ tarafta genişleme görülür.Gaita çok azalmış, koyu yeşil renkte ve çamur kıvamındadır.İntoksikasyon gerçekleştiğinde hastalarda pis kokulu bir ishal oluşabilir.

**Korunma:**

Yüksek verimli süt inekleri doğumdan önce ve sonra yeterli miktarda iyi kaliteli kaba yemle beslenmelidir. Konsantre yemdeki yağ oranı %5-6'yı geçmemelidir. Konsantre yemler 3-4 öğüne bölünerek verilmelidir. İleri gebelikte ani ve alışılmadık hareketlerden kaçınılmalıdır.

**Tedavi:**

Veteriner Hekime danışılmalıdır.

