

KOKSİDİYOZ

Genç sığırlarda akut yada kronik bir enteritis ile karakterize bulaşıcı bir protozoer hastalıktır. Özellikle 2-6 aylık buzağılarda şiddetli seyretmektedir.

Belirtileri:

Sığırlarda akut seyreder. Hastalık ani ishal ile başlar. Birkaç gün devam eden ishalde başlangıçta sulu olan gaita hızla hemorajik bir şekle dönüşür. Dışkıda kan pıhtıları görülebilir. Hastaların perineum bölgesi ve arka bacakları kanlı dışkı ile bulaşmıştır. Hasta hayvanların karınları çekik, sırtları kambur görünüştedir. Hastalarda iştahsızlık, zayıflama ve anemi görülür. Ayrıca hastaların genel durumu hızla bozulur. Vücut ısısı başlangıçta yükselir, daha sonra normal sınırlarda seyreder.

Kronik olaylarda kanlı yada kansız olabilen ishal, dehidrasyon, zayıflama, durgunluk ve kıllarda karışıklık görülebilir.

Mortalite oranı %10-50 arasında değişir. En çok akut devrede ölümler görülür. Hastalığı atlatanlar gelişmelerini tamamlayamazlar, diğerlerinden geri kalırlar.

Korunma:

Öncelikle hasta hayvanlar ayrılır ve tedavi edilir. Barınaklardaki sıkışıklık önlenir, havalandırmaya dikkat edilir, altlıklar sık sık değiştirilir (en geç 5 günde bir), ahırda gübre bırakılmaz dışarı alınır. Zemin dezenfekte edilir. Yemlik ve suluklar temiz tutulur.

Bütün bu tedbirlere rağmen sürüde koksidiozis problemi önlenemiyorsa koruyucu ilaç kullanılabilir.

Tedavi:

Veteriner Hekime başvurulmalıdır.